

Ignoran 70% de portadores que tienen Hepatitis C



Notimex - En conferencia de prensa para presentar el movimiento "Voces por la Hepatitis C", el experto indicó que lo anterior representa una carga económica muy fuerte para el sector salud, pues son atendidos los enfermos en etapas avanzadas cuando ya desarrollaron cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Se calcula que en México poco más de un millón de hombres y mujeres, entre 30 y 70 años de edad, padecen Hepatitis C, pero solo una tercera parte recibe tratamiento oportuno y tiene posibilidad de curación, aunque si la enfermedad es detectada a tiempo tiene muchas posibilidades de eliminarse.

Al anunciar las acciones que enmarcarán el Día Mundial de las Hepatitis Virales, que se conmemora el 28 de julio, precisó que más de la mitad de las personas diagnosticadas con la enfermedad no tienen acceso a tratamientos oportunos, debido a que no cuentan con protección social y tienen que enfrentar gastos catastróficos.

"De acuerdo a cálculos basados en las cifras de prevalencia, se estima que la incidencia de Hepatitis C en México equivale a 19 mil 300 casos nuevos cada año, de los cuales solo entre 30 y 40 por ciento son susceptibles de recibir tratamiento, lo cual da un carácter de prioritario a la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan mejorar el acceso al tratamiento", planteó.

Wolpert Barraza informó que FundHepa entregó al comisionado nacional de Protección Social en Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, la información para que se analice y realicen los estudios actuariales para incorporar a la cobertura del Seguro Popular la atención de Hepatitis C y acciones de detección temprana.

Señaló que esta enfermedad es silenciosa y que cuando se tienen síntomas es ya demasiado tarde, incluso una persona puede haber portado el virus por más de 30 años, por lo que su hígado está tan dañado que muchas veces la solución es un trasplante.

Es importante, puntualizó, tomar conciencia de los factores de riesgo para contraer Hepatitis C, ya que con eso se puede evitar la enfermedad o detectarla tempranamente. Entre ellos está el usar drogas intravenosas, hacerse tatuajes o perforaciones, y transfusiones sobre todo antes de 1994.

El doctor Wolpert comentó que en muchos de los casos la detección se da por razones fortuitas, como al donar sangre o al realizarse un examen sanguíneo de rutina, y apuntó que la detección temprana de la Hepatitis C incrementa en los pacientes la posibilidad de superar dicho padecimiento hasta en 80 por ciento.

Refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las entidades con los mayores índices de prevalencia de Hepatitis C son: Baja California, Nayarit, Morelos, Yucatán, Jalisco, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.