

Investiga INSP en la Costa Oaxaqueña formas de transmisión del Dengue

Escrito por administrador

Martes, 19 de Julio de 2011 00:00

Por Mario Alberto García Aguilar/ La Química Jefe de Sección del Instituto Nacional de Salud Publica con sede en Tapachula Liliana Rosalía Amado García informó que están visitando 3 municipios del estado de Oaxaca, Pochutla, Huatulco y San Pedro Mixtepec con la finalidad de capacitar al personal que les apoyará para realizar una investigación o estudio que se está llevando a cabo en el Centro Regional de Salud Publica en Tapachula.

El estudio se titula Eficiencia en la dinámica de la trasmisión del virus dengue en localidades de México.

Se ha detectado que hay dos tipos de trasmisión del Dengue: La Horizontal que se lleva a cabo cuando el mosquito pica a un humano infectado y se infecta, y este a su vez al paso de los 7 días desarrolla la enfermedad, vienen mosquitos sanos y pican al humano y quedan infectados, entonces ese es un ciclo en el cual se da la trasmisión; la que llamamos trasmisión transovarica es cuando el mosquito infectado pica al humano y este a su vez desarrolla la enfermedad en los 7 a 12 días, viene otro mosquito sano, lo pica y ese mosquito pone sus huevecillos y los huevecillos que pone ya están infectados, o sea lo trasmite de esa forma a su descendencia, ya no necesitan esos hijos de mosquitos ir a picar para infectarse, sino ya los huevecillos vienen infectados, a eso se les llama infección vertical y eso es lo que se va a investigar para saber si existe ese tipo de trasmisión en estos lugares.

Las principales instituciones beneficiadas serán las jurisdicciones sanitarias ya que la información generada les dará la pauta para enfrentar estas modalidades de infección de dengue.